

Gewasbescherming in vezelvlas

- Lijst van de erkende producten in België -

(7 april 2016)



Actieve stof	Handelsproducten	Erkende dosis/ha	Max. aantal toepassingen	Ter bestrijding van	Erkend toepassingsstijdstip	Bufferzone ⁽¹⁾ en opmerkingen
Zaaizaadontsmetting						
					zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
prochloraz 200 g/l	Prelude 20 LS	0,2 l/100 kg		phoma, grauwe schimmel		opgebruiktermijn 30/06/2017
metalaxyl-M 339 g/l	Apron XL	0,04 l/100 kg		pythium		noodtoelating: 10/12/2015-08/04/2016
fludioxonil 25 g/l	Celest	0,13 l/100 kg		phoma, botrytis, fusarium, alternaria		noodtoelating: 10/12/2015-08/04/2016
Insectenbestrijding						
					zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
alpha-cypermethrin 50 g/l	* Fastac	0,25 l	2	aardvlooien, trips	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen	20 m met 90% driftreducerende techniek
zeta-cypermethrine 100 g/l	Fury 100 EW Minuet	0,075 l	2	aardvlooien	opkomst - 4 bladeren	20 m met klassieke techniek; max. 2 toepassingen per 12 maanden
lambda-cyhalothrin 100 g/l	Karate Zeon Karis 100 CS Korado 100 CS Ninja	0,0625 l	2	aardvlooien	wachttijd 42 dagen	10 m met klassieke techniek
	Karate Zeon Karis 100 CS Korado 100 CS Ninja	0,075 l	1	trips	wachttijd 42 dagen	10 m met klassieke techniek
deltamethrin 25 g/l	Decis EC 2,5 Deltaphar Mezene Patriot Splendid	0,25 l	1	trips		5 m met klassieke techniek
Voorkomen van legeren						
					zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
ethephon 480 g/l	* Arvest * Cerafon * Ethephon Classic * Ehtepro * Flordimex 480	1,5 l	1			1 m met klassieke techniek
Ziektebestrijding						
					zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
prothioconazool 480 g/l	Rudis	0,35 l	2	echte meeldauw	vóór bloei	5 m met klassieke techniek
quinoxyfen 500 g/l	* Fortress	0,3 l	2	echte meeldauw		5 m met klassieke techniek

Actieve stof	Handelsproducten	Erkende dosis/ha	Max. aantal toepassingen	Ter bestrijding van	Erkend toepassingstijdstip	Bufferzone ⁽¹⁾ en opmerkingen
--------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------	--

Onkruidbestrijding

Vooropkomst					zaai	opkomst	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	bloei	roten	
linuron 450 g/l	Afalon SC	0,8-1,1 l	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		1 m met klassieke techniek
linuron 500 g/l	Datura Linuris 500 SC Linuron 500 SC Linustar	0,7-1 l	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		1 m met klassieke techniek
	Linugan 500 SC Linurex 50 SC	0,7-1 l	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		10 m met klassieke techniek
sulcotrione 300 g/l	Dractar Sudoku Zeus Suporter Veneur	1,5 l	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		1 m met met klassieke techniek; Een periode van 5 maanden na toepassing en een grondbewerking zijn noodzakelijk om fytotoxiciteit op volgteelten te vermijden.
	Sulcogan	1,5 l	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		10 m met met klassieke techniek; Een periode van 5 maanden na toepassing en een grondbewerking zijn noodzakelijk om fytotoxiciteit op volgteelten te vermijden.

Na-opkomst tweezaadlobbige onkruiden

Na-opkomst tweezaadlobbige onkruiden					zaai	opkomst	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	bloei	roten	
amidosulfuron 75%	* Gratil	40 g		kruisbloemigen, kleeftkruid																		1 m met klassieke techniek
bromoxynil 385 g/l	* Xınca	1 l	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		20 m met klassieke techniek
bromoxynil 250 g/l	* Bromotril SC	1 l	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		1 m met klassieke techniek
clopyralid 100 g/l	* Cliophar 100 SL * Matrigon * Vivendi 100 SL	1,5 l	1	samengesteldbloemige onkruiden, distels																		1 m met klassieke techniek; max. 1 toepassing per 12 maanden
	* Glopyp 100 SL	1,5 l	1	samengesteldbloemige onkruiden, distels																		5 m met klassieke techniek; max. 1 toepassing per 12 maanden
clopyralid 600 g/l	Cliophar 600 SL Matrigon 600	0,25 l	1	samengesteldbloemige onkruiden, distels																		1 m met klassieke techniek; max. 1 toepassing per 12 maanden
clopyralid 72%	* Matrigon SG	0,21 kg	1	samengesteldbloemige onkruiden, distels																		1 m met klassieke techniek; max. 1 toepassing per 12 maanden
flupyrsulfuron-methyl 33,3% + metsulfuron-methyl 16,7%	* Lexus XPE	25 g of 2 keer 12,5 g	2	tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende), duizendknopigen																		1 m met klassieke techniek
iodosulfuron-methyl-natrium 100 g/l + mefenpyr-diethyl 300 g/l	* Hussar Ultra	60 ml	1	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden																		1 m met klassieke techniek
MCPA 750 g/l	* Agroxone 750 * Agroxyl 750 * Ceridor MCPA * U 46 M * U 46 M750	0,27-0,33 l	1	tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)																		1 m met klassieke techniek
MCPA 250 g/l	* U46-M-250 * U46 M250 Extra	0,8-1 l	1	tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)																		1 m met klassieke techniek
metsulfuron-methyl 20%	* Accurate * Finy * Isomexx	20 g	1	tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)																		2 m met klassieke techniek
	* Allie * Deft * Savvy	20 g	1	tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)																		1 m met klassieke techniek
	* Metro SG	20 g	1	tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)																		10 m met klassieke tehcniek

Actieve stof	Handelsproducten	Erkende dosis/ha	Max. aantal toepassingen	Ter bestrijding van	Erkend toepassingstijdstip	Bufferzone ⁽¹⁾ en opmerkingen
--------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------	--

Na-opkomst grassen					zaai	opkomst	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	bloei	roten	
cycloxydime 100 g/l	Focus Plus	2 l		eenjarige grasachtige onkruiden																		
		4-6 l		kweekgras																		
propaquizafop 100 g/l	Agil	0,75-1 l		eenjarige grasachtige onkruiden																		
		1-1,2 l		raaigras, wilde haver																		
		1,5 l		kweekgras																		
quizalofop-ethyl-D 50 g/l	Targa Prestige	1-1,5 l	1	duist, hanepoot, windhalm																		
	Targe Megamax	1,25-1,5 l	1	wilde haver, graanopslag																		
		3 l	1	kweekgras																		1 m met klassieke techniek
quizalofop-p-tefuryl 40 g/l	Pantera	2,25 l	1	eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag																		1 m met 90% driftreducerende techniek; Een wachttijd van 120 dagen moet gerespecteerd worden voor het zaaien of het planten van de volgende teelt.
tepraloxymid 50 g/l	* Aramo * Tanagra	1 l	1	eenjarige grasachtige onkruiden, duist, hanepoot, raaigras, straatgras, wilde haver, graanopslag																		
		1,5 l	1	straatgras (uitstoeling)																		
		2 l	1	kweekgras																		
fluazifop-P-butyl 125 g/l	Fusilade Max	1 l	1	duist, hanepoot																		
		1,5 l	1	raaigras, wilde haver, windhalm, graanopslag																		

Tijdens het roten					zaai	opkomst	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	bloei	roten	
diquat 200 g/l	Barclay D-Quat Brogue Diqua Diquanet Enkor Plus Kalahari Life Scientific Diquat Quad-Glob 200 SL Quickfire	3 l	1	onkruiden																		10 m met klassieke techniek; max. 1000 g diquat/ha/12 maanden
	Falcon Mission 200 SL	3 l	1	onkruiden																		
glyfosaat 36%	Buggy 36 SG	4 kg	1	onkruiden																		1 m met klassieke techniek
glyfosaat 360 g/l	Prologue	4 l	1	onkruiden																		1 m met klassieke techniek

* zaden van behandeld vlas niet in de diervoeding gebruiken

⁽¹⁾ Het is verplicht de bufferzone zoals vermeld op het etiket na te leven. De bufferzone is een niet behandelde strook van het terrein in de nabijheid van een wateroppervlak.

Indien er geen bufferzone wordt vermeld op het etiket, is men wettelijk verplicht om een niet behandelde zone te respecteren van minimaal 1 m.

Naargelang de regionale wetgevingen (Vlaanderen en Wallonië) kan deze minimale niet behandelde zone variëren (in Vlaanderen 1 m, langs heel wat waterlopen in Wallonië 6 m).

Lees aandachtig de bijsluiter van het handelsproduct vóór gebruik voor alle erkenningsvoorwaarden en raadpleeg bij twijfel de website van Fytoweb (www.fytoweb.fgov.be)

Inagro vzw is niet aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze opgave.