



GUSTAV

WINTERTARWE

Mandataris of verdeler: Clovis Matton
Jaar van eerste opname Europese rassenlijst: 2015
Landen van inschrijving: DE, LT
Kweker (bron: mandataris): Von Borries Eckendorf (D)
Kruising: -
Vroeg(rijp)heid (bron: mandataris): oprichten: halflaat; aarvorming en afrijping: laat
Chloortoluron (bron: mandataris): gevoelig

Datum: september 2018

Oogstresultaten

➤ Graanopbrengst (%)

Jaar	LEEM- EN ZANDLEEMGEBIED						KUSTPOLDER			WASE POLDER
	West-Vlaanderen		Oost-Vlaanderen		Vlaams-Brabant	Limburg	West-Vlaanderen		gemiddelde	Oost-Vlaanderen
	Poperinge	Zwevegem (Sint-Denijs)	Bottelare	Geraardsbergen (Nieuwenhove)	Huldenberg	Tongeren	Koksijde	Houtave		Kieldrecht
	<i>zandleem</i>	<i>(zand)leem</i>	<i>zandleem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>	<i>klei</i>	<i>klei</i>		<i>lichte polder</i>
2017	91,9%	96,7%	96,0%	100,0%	96,3%	-	-	93,6%	93,6%	98,9%

Leem- en Zandleemgebied: 3,8% onder het gemiddelde in 2017, doch slechts 1 jaar proefresultaten

Kustpolder: 6,4% onder het gemiddelde in 2017, doch slechts 1 jaar proefresultaten

Wase polder: iets onder het gemiddelde in 2017, doch slechts 1 jaar proefresultaten

➤ Hectolitergewicht (kg)

Ras	2017
Gustav	78,7 kg
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>77,9 kg</i>

Beoordeling: laag – tamelijk laag – gemiddeld – tamelijk hoog – hoog

➤ Duizendzadengewicht (gram)

Ras	2017
Gustav	45,0 g
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>43,9 g</i>

Beoordeling: laag – tamelijk laag – gemiddeld – tamelijk hoog – hoog

➤ Vochtgehalte bij oogst (%)

Ras	2017
Gustav	14,9%
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>14,8%</i>

Raskenmerken

➤ Strolengte (cm)

Ras	2017
Gustav	84,5 cm
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>79,5 cm</i>

Beoordeling: zeer kort – kort – tamelijk kort – gemiddeld – **tamelijk lang** – lang

➤ **Legergevoeligheid:** geen gegevens

➤ **Vroegheid aarvorming** (2017): zeer vroeg – vroeg – halfvroeg – **gemiddeld – halflaat** – laat

Ziektegevoeligheid

➤ **Blad- en aarziekten** (schaal 1-9; 1 = zeer veel, 3 = veel, 5 = matig, 7 = weinig, 9 = geen)

			2017
- witziekte (meeldauw)	Gustav		8,9
	<i>gemiddelde alle rassen</i>		<i>7,8</i>
- bladvlekken (septoria, ...)	Gustav		-
	<i>gemiddelde alle rassen</i>		<i>-</i>
- gele roest	kustpolder	Gustav	7,7
		<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>7,8</i>
	binnenland	Gustav	7,5
		<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>7,9</i>
- bruine roest	Gustav	8,1	
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>6,1</i>	
- aarziekten (aarfusarium, ...)	Gustav	-	
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>-</i>	

Beoordeling: behoort tot de minst gevoelige rassen voor bruine roest

➤ **Gevoeligheid aarfusarium en mycotoxinen DON** (infectieproeven tot en met 2017): geen gegevens

Overige kenmerken

➤ **Oranje tarwegalmug** (Bron: CRA-W Gembloux): **gevoelig** – resistent