



BRITANNIA

WINTERTARWE

Mandataris of verdeler: Phytosystem nv
 Jaar van eerste opname Europese rassenlijst: 2013
 Land van inschrijving: UK
 Kweker (bron: mandataris): Limagrain (UK)
 Kruising (bron: mandataris): Robigus x Cassius
 Vroeg(rijp)heid (bron: mandataris): doorschieten: halflaat; aarvormen: laat
 Chloortoluron (bron: mandataris): gevoelig

Datum: september 2018

Oogstresultaten

➤ Graanopbrengst (%)

Jaar	LEEM- EN ZANDLEEMGEBIED						gemiddelde	KUSTPOLDER		WASE POLDER Oost-Vlaanderen Kieldrecht	
	West-Vlaanderen		Oost-Vlaanderen		Vlaams-Brabant	Limburg		West-Vlaanderen	gemiddelde		
	Poperinge	Zwevegem (Sint-Denijs)	Bottelare	Geraardsbergen (Nieuwenhove)	Huldenberg	Tongeren		Koksijde	Houtave		
	<i>zandleem</i>	<i>(zand)leem</i>	<i>zandleem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>		<i>klei</i>	<i>klei</i>		
2018	92,9%	96,0%	96,8%	101,7%	100,6%	100,5%	98,1%	103,8%	108,0%	105,9%	-
2017	98,0%	93,4%	96,9%	98,3%	97,6%	100,1%	97,4%	100,8%	102,0%	101,4%	96,4%
2016	107,5%	101,5%	106,9%	-	107,8%	-	105,9%	102,0%	106,8%	104,4%	99,2%
2015	99,0%	98,9%	102,3%	98,3%	96,6%	96,9%	98,7%	104,8%	101,3%	103,1%	102,1%
gemiddelde							100,0%			103,7%	

Leem- en Zandleemgebied: over de laatste 4 jaar enkel in 2016 goed resultaat, de overige 3 jaar globaal 1,9% onder het gemiddelde

Kustpolder: goed resultaat over de laatste 4 jaar

Wase polder: niet in proef in 2018

➤ Hectolitergewicht (kg)

Ras	2018	2017	2016
Britannia	78,1 kg	75,5 kg	72,2 kg
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>79,5 kg</i>	<i>77,9 kg</i>	<i>72,8 kg</i>

Beoordeling: laag – tamelijk laag – gemiddeld – tamelijk hoog – hoog

➤ Duizendzadengewicht (gram)

Ras	2018	2017	2016
Britannia	45,5 g	42,0 g	41,2 g
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>45,6 g</i>	<i>43,9 g</i>	<i>41,7 g</i>

Beoordeling: laag – tamelijk laag – gemiddeld – tamelijk hoog – hoog

➤ Vochtgehalte bij oogst (%)

Ras	2018	2017	2016
Britannia	12,9%	14,6%	14,9%
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>12,5%</i>	<i>14,8%</i>	<i>14,9%</i>

Beoordeling: laag – tamelijk laag – gemiddeld – tamelijk hoog – hoog



BRITANNIA

Raskenmerken

➤ Strolengte (cm)

Ras	2018	2017	2016
Britannia	77,1 cm	75,8 cm	79,2 cm
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>79,5 cm</i>	<i>79,5 cm</i>	<i>81,0 cm</i>

Beoordeling: kort – tamelijk kort – gemiddeld – tamelijk lang – lang

➤ **Legergevoeligheid:** geen gegevens

➤ **Vroegheid aarvorming** (2018-2017-2016): vroeg – halfvroeg – gemiddeld – **halflaat – laat**

Ziektegevoeligheid

➤ **Blad- en aarziekten** (schaal 1-9; 1 = zeer veel, 3 = veel, 5 = matig, 7 = weinig, 9 = geen)

		2018	2017	2016	2015
- witziekte (meeldauw)	Britannia	-	-	-	-
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	-	-	-	-
- bladvlekken (septoria, ...)	Britannia	-	-	5,9	6,8
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	-	-	6,2	6,6
- gele roest	kustpolder				
	Britannia	2,9	4,9	5,4	8,7
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	6,4	7,8	6,5	7,7
	binnenland				
	Britannia	5,1	3,9	8,0	8,3
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	7,8	7,9	7,6	8,0
- bruine roest	Britannia	-	-	8,5	7,0
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	-	-	6,8	6,1
- aarziekten (aarfusarium, ...)	Britannia	-	-	5,3	-
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	-	-	5,3	-

Beoordeling: behoort tot de gevoeligste rassen voor gele roest

➤ **Gevoeligheid aarfusarium en mycotoxinen DON** (infectieproeven tot en met 2018): gevoelig – matig gevoelig – **matig tolerant** – tolerant

Overige kenmerken

➤ **Oranje tarwegalmug** (Bron: CRA-W Gembloux): geen gegevens